



Circoncision chez l'enfant


Instructions après l'intervention

On a effectué une circoncision pour enlever le prépuce de l'enfant.

L'enfant a été circoncis. Son prépuce a été enlevé pour découvrir le gland de son pénis. Au site de l'incision, les bords de la peau ont été rapprochés au moyen de points de suture fondants. Ces points tomberont d'eux-mêmes. Vous devez demander des instructions par rapport à la prise de bains ou de douches.

Si on a utilisé un pansement, demandez ce qu'il faut faire par la suite. Il se peut que votre urologue recommande l'usage d'un onguent sur le pénis. Toute enflure ou ecchymose (bleu) sur le pénis disparaîtra généralement moins de deux semaines après la circoncision.

Pénis circoncis avec points de suture



Les effets de l'anesthésie auront disparu complètement en moins de 24 heures. Il se peut également qu'on ait utilisé un anesthésique local (« pour geler ») pendant la chirurgie. Ses effets se dissiperont lentement sur plusieurs heures.

Il y a habituellement peu de douleur et elle disparaît normalement après quelques jours. Vous pouvez au besoin donner de l'acétaminophène (Tempra®, Tylenol®, etc.) à l'enfant, à la dose recommandée selon son âge. Le gland du pénis, maintenant à découvert, est habituellement sensible pendant quelques semaines. L'enfant sera probablement plus confortable s'il porte des vêtements amples et si vous ne lui mettez pas de couche, selon le cas.

L'enfant devrait pouvoir uriner normalement après la circoncision. La plupart des urologues sont d'avis que les garçons peuvent prendre un bain 24 heures après l'intervention.

La plupart des garçons devraient pouvoir retourner à l'école ou à la garderie quelques jours après la circoncision.

Précautions

Un peu de sang peut suinter de l'incision pendant les premières 48 heures. Normalement, le saignement s'arrêtera si vous appuyez fermement sur la région qui saigne avec un tampon de gaze ou un papier mouchoir propres pendant 10 minutes. Si le saignement continue, communiquez avec votre médecin ou rendez-vous à la salle d'urgence de votre hôpital.

Un écoulement qui sent mauvais, une augmentation de l'enflure ou de la rougeur du pénis après quatre jours peuvent être des signes d'infection. Veuillez communiquer avec votre urologue si vous avez des inquiétudes.

Suivi

Vous devriez prendre rendez-vous pour le suivi avec votre urologue ou votre médecin de famille.

